

云南杀红蜘蛛

生成日期: 2025-10-06

辣椒水喷杀法家庭养花可以用煮辣椒水放凉后喷杀，也可以使用烟水或烟头浸水喷洒叶片。药水喷洒法红蜘蛛高发于高温不通风环境，预防初始。预防初始！红蜘蛛它繁殖率十分惊人，7-10天繁殖一代。所以，发现感到严重的植株，就要连土包扎扔到垃圾箱，否则会在周围小区传染开的。我家香草是抗拒农药的，所以我曾经用“剃头修剪”+“每周喷新鲜牛奶”这样的办法治的红蜘蛛，效果还是不错的，但还是很费精力的，就忙起来就顾不到喷牛奶了。红蜘蛛不是昆虫，因此很多杀虫剂对其无效。云南杀红蜘蛛

危害特点●不同地理位置或不同薺马对柑橘的为害部位及影响存在差异，如西花薺马、日本薺马、橙黄薺马*危害柑橘花器，而八节黄薺马、禾薺马等则会危害果实。●为害柑橘的薺马在柑橘花期出现高峰期，谢花后幼果期出现第二个高峰期，第三个高峰期为9~10月秋梢抽发期。●薺马嗜甜，柑橘开花时花蜜肯定会招来薺马为害，但在嫩梢上薺马对茂谷柑有偏好，因此各柑橘品种中茂谷柑被害较为严重。●二龄幼虫是主要取食为害虫态，谢花后至幼果膨大前期为害重。秋梢期出现的高峰峰值较低，原因在于栖花危害的薺马转移到园内杂草及周边作物上危害。薺马为何成灾？自身原因①薺马个体非常小，肉眼不容易看清楚，通常是出现症状后，才会意识到有薺马为害。②薺马有昼伏夜出的习性，阴天、早晨、傍晚和夜间才在寄主表面活动。平时喜欢藏在花内和叶片背面，而卵一般在植物组织中，很难杀死。云南杀红蜘蛛红蜘蛛柑橘红蜘蛛，学名柑橘全爪螨，是为害柑橘的非常让人头疼的大害虫。

眼下柑橘处于花期，正值薺马的发生高峰，各位果农切不可疏于防治。认识薺马薺马是一种体型微小，隐匿性强的昆虫，成虫体长约0.5~5mm，体色多为棕色至黑色。食性比较复杂，包括植食性、捕食性和菌食性。以下来重点说一说薺马对柑橘的危害及其特点。主要危害为害柑橘的有30多种，主要有柑橘薺马、茶黄薺马、黄胸薺马、八节黄薺马、禾薺马等。薺马对柑橘的为害一般表现为成虫和若虫针对柑橘的花、幼果、嫩梢、叶片进行为害，其中以花和幼果为主。叶片受害：初为失绿黄白色小斑点，随后在中脉两侧形成灰白色条斑，危害严重的叶片发生黄化、变薄变小、扭曲。花器受害：以盛开期的花为主，导致受害花或花蕾提前脱落，造成畸形果，影响坐果率。果实受害：薺马在萼片下取食幼果，锉伤幼果果皮，幼果表皮细胞破裂，逐渐失水干缩，疤痕随果实膨大而扩展，呈现不同形状的木栓化银白色或灰白色的斑痕。

小麦红蜘蛛的病害及防治方法一、红蜘蛛1、发生特点小麦红蜘蛛又叫麦蜘蛛、火龙、麦虱子等，麦田普遍发生。除危害小麦外，还危害大麦、豌豆、油菜等。以成虫和幼虫危害小麦叶片，使叶片失绿、枯黄，甚至全株枯死。危害小麦的有圆蜘蛛和麦长腿蜘蛛。前者多发生在地势低洼潮湿、水浇地、生长茂密的麦田；后者多发生在地势高或灌溉条件较差的麦田。2、麦圆蜘蛛：在豫北、陕西关中、皖北、鄂西北等地一年2—3代，四川部分地区一年发生3代。以成虫、卵和若螨在麦根土缝、杂草或枯叶上越冬，以成虫为主。营孤雌生殖，耐寒力强，温度达到4.8度时越冬卵即开始孵化，成、若螨也有群集性，此虫爬行能力强，遇惊动即入土或迅速向下爬行，中的6—8时和18—22时在麦株上活动危害。麦长腿蜘蛛：西藏大部分农区一年1—2代，山西北部麦冬区一年发生两代，以成虫或滞育卵于石块下越冬。产卵特点：5月上旬产的卵，卵期平均为6天，10月产的为20—30天，适繁殖温度为15—20度。喜阴凉，畏强光。危害特征叶片危害症状。

常规药剂持效性太短或没有内吸性，在新梢快速抽生时，新生部分仍存在被害风险。忽略比较好用药时期与防治关键期，导致薺马的大发生。综合防治措施①加强橘园管理，适时清园，冬季虫害活动性小，清园工作可有效减少次年虫源基数，降低危害。②利用薺马等昆虫趋蓝性的特点，同时结合昆虫性诱芯诱杀，在薺马发

生初期(开花前)悬挂蓟马篮板20~30块/亩，减少危害的种群密度。③蓟马有入土化蛹的习性，在蓟马的主要发生期可进行地面覆盖或生草。④药剂防治抓住适期，每批梢刚出来的时候一定要注意防治，尤其是花期(包括开花前及谢花后)、幼果期、夏梢和秋梢期。选择药剂的时候要选择较快性和持效药剂相互配合使用，喷药时全株喷透、喷均匀，如有套种也要一起喷药防治。药剂选择：乙基多杀菌素、螺虫乙酯、毒死蜱、吡丙醚·虫螨腈、唑虫酰胺、噻虫嗪等。红蜘蛛体型小比较隐蔽，喷药难以做到全覆盖，药效过去后容易反弹叶背的红蜘蛛及卵。

云南杀红蜘蛛

红蜘蛛为什么这么难打？云南杀红蜘蛛

- 目前效果比较好杀螨剂组合：霸中霸（15%乙螨唑SC□1500倍+司满光300倍。
司满光——杀虫杀螨增效助剂，对粉虱、蚜虫、木虱、蓟马、红蜘蛛药剂增效，稀释倍数300~500倍，对温度不敏感。
- 目前效果比较好杀螨剂组合：峦克（24%螺螨酯SC□2000倍+司满光300倍。
- 目前效果比较好杀螨剂组合：满安得（43%联苯肼酯SC□3000倍+高维达400倍。

柳州市惠农化工有限公司创办于1996年，是广西中部原化工部（现工信部）核准农药生产定点企业，2013年被认定为广西高新技术企业。公司通过ISO9001□2008质量管理体系认证，系“柳州市植物保护学会第六届理事单位”、“中国农药信息网会员单位”、“安全标准化三级评估达标企业”、2012年被评为“安全文化示范企业”。
云南杀红蜘蛛

柳州市惠农化工有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在广西壮族自治区柳州市等地的农业行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为行业的翘楚，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将引领惠农化工供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋进，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！